

Số: /TTDVNN-TT&BVTV  
V/v Phòng trừ sâu, bệnh hại cây lúa giai  
đoạn ôm đồng – trở vụ mùa năm 2022.

Cẩm Thủy, ngày tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong những tháng cuối năm 2022, xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông sẽ hoạt động theo đúng quy luật khí hậu, vào thời kỳ đầu mùa bão sẽ xuất hiện ở khu vực bắc Biển Đông và sau đó dịch chuyển dần xuống khu vực giữa và nam Biển Đông trong những tháng cuối năm. Đề phòng những cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp. Diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, trong thời gian tới, trời tiếp tục nắng nóng, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ và ẩm độ thay đổi thất thường...

Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng, hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái ôm đồng - trở bông - phơi màu, một số sâu, bệnh hại xuất hiện và gây hại cục bộ như: Sâu cuốn lúa 5, chủ yếu tuổi 4 – tuổi 5, mật độ 3 – 5 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 8con/m<sup>2</sup>; sâu đục thân lúa 4, tuổi 3 – tuổi 5, tỷ lệ hại phổ biến 1 - 2%, cao 6 - 8% danh héo; rầy lưng trắng lúa 5, chủ yếu trưởng thành – tuổi 1, mật độ phổ biến 36 – 48 con/m<sup>2</sup>, cao từ 80 – 100 con/m<sup>2</sup>; bệnh Đốm nâu, Vàng lá vi khuẩn, Khô vằn, Đạo ôn tỷ lệ phổ biến 3-6%, cao 10-16%,... rải rác trên địa bàn các xã Cẩm Tú, Cẩm Quý, Cẩm Ngọc, Cẩm Giang, Cẩm Vân và Cẩm Bình... Để cây lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo mục tiêu năm 2022 toàn huyện tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 57.860 tấn trở lên, Trung tâm DVNN huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện một số biện pháp sau:

### **1. Đối với sâu hại**

**1.1. Sâu đục thân:** Khi phát hiện thấy mật độ từ 2,5 – 5 % bông bạc, tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Dupont™, Prevathon® 5SC; Gàndi 95 SP; Voliam targo 063 SC; Victory 585EC; Virtako 40WG... và các thuốc khác có cùng hoạt chất đã được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

**1.2. Sâu cuốn lá:** Tiến hành phun trừ khi mật độ từ 10 – 20 con/m<sup>2</sup> bằng một trong số loại thuốc đặc hiệu như: Padan 95 SP, Patox 95SP, Tango 800WG, Ammate 150 SC, Dylan 2EC, Virtako 40WG, Radiant 60SC, Radiant 60SC ...

**1.3. Rầy nâu, rầy lưng trắng:** Sẽ tiếp tục nở và gia tăng mật độ vào giai đoạn lúa trở đến chín sấp. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là các giống nhiễm để phun trừ kịp thời nơi có mật độ cao (trên 1.500con/m<sup>2</sup>) bằng các loại thuốc: Chess 50WG, Cheestar 50WG, Startcheck 755WP, Sagometro 50WG, Prevathon 5SC...

## **2. Đối với bệnh hại**

Bệnh đốm nâu, bệnh đốm sọc vi khuẩn tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn số 09/TTDVNN-TT&BVTV, ngày 01/8/2022, về việc chăm sóc và phòng trừ một số đối tượng gây hại cây lúa giai đoạn đứng cái – ôm đòng vụ mùa năm 2022.

**2.1. Bệnh khô vằn:** Kiểm tra và phun trừ khi bệnh mới xuất hiện bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin như: Validacin 5L, Vali 5SL, Vivadamy 5WP,... hoặc thuốc Nevo 330EC, Mixperfect 525SC,... phun kỹ vào vùng bệnh và các dây lúa gần bờ kết hợp vệ sinh bờ ruộng sạch sẽ.

**2.2. Bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt:** sẽ phát sinh và gây hại nặng giai đoạn lúa trở - chín, cần theo dõi thời gian lúa trở để phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa chạy về thưa (trở 3- 5%) trên tất cả các giống bằng các loại thuốc như Kamsumin, Beam 75WP, Bump 650 WP, Kasoto 200SC, Filia 525SC, Feno Super 268 WP, Sako 25WP, Vibimzol 75WP, Bemsuper 500SC, Flash 75WP,... kết hợp phun phòng bệnh lem lép hạt bằng TiltSuper 300EC, Vivil 5SC, Sagograin 300EC, AmistarTop 325SC, Mixperfect 525SC,... Phun lại lần 2 khi lúa vừa trở xong (sau lần 1 khoảng 7- 10 ngày).

**3. Chuột hại:** Giai đoạn này là thời điểm chuột chủ yếu sinh sống trên đồng ruộng, chuột cái vào hang để sinh sản nên tổ chức tìm hang để đào bắt, săn bắt rất có hiệu quả (biện pháp này bắt được nhiều chuột cái và chuột con), kết hợp đặt mồi bã quanh bờ ruộng, dè đập bằng thuốc hóa học như: Gimlet 0.2GB, Racumin TP 0.75... Không nên sử dụng điện để đánh bắt chuột.

Riêng giống lúa nếp hạt cau trồng tại xã Cẩm Phú, Cẩm Giang giai đoạn hiện tại đã kết thúc đẻ nhánh, chú ý bón thúc sớm, bón bổ sung 3-4kg kali/sào 500m<sup>2</sup> cây cứng, tăng quá trình hấp thụ phân bón; giúp cho gié, hoa không bị thoái hoá, số hạt trên bông tăng, giảm hạt xanh, lép lửng và bạc bụng, phòng chống sâu bệnh hại giai đoạn sau, tăng phẩm chất gạo. Chú ý mật độ sâu đục thân để có biện pháp

phòng trừ kịp thời.

**Chú ý:** Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng; nồng độ, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn in trên bao bì; thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vào đúng nơi quy định. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát (tránh lúc lúa phơi màu).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời là điều kiện tiên quyết quyết định đến năng suất của cây lúa. Trung tâm DVNN đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBND huyện(để b/c);
- Phó CT UBND huyện Phạm Minh Vũ (để b/c);
- BGĐ Trung tâm (để b/c);
- Phòng NN&PTNT;
- Trung tâm VHHT,TT&DL (ph/h đưa tin);
- Lưu VT, TT&BVTV.

**GIÁM ĐỐC**

**Lưu Tuấn Nghĩa**